

## 國防部軍備局生產製造中心第二0五廠「雇九等護理作業員」筆試測驗題庫

## 選擇題400題

編號	答案	試題
001		下列何種癲癇發作後會出現托特氏麻痺 (Todd' sparalysis) ? ①運動發作 ②強直陣攣性發作 ③失神性發作 ④複雜性部分發作。
002		下列何者是輸血反應中急性溶血反應最常見的主因? ①過敏體質 ②白血球產生抗體 ③ABO血型不合 ④血液血漿蛋白過敏。
003		下列何者由腦下腺後葉分泌? ①褪黑激素 (Melatonin) ②催產激素 (Oxytocin) ③生長激素 (Growthhormone) ④泌乳素 (Prolactin)。
004		下列何種免疫球蛋白是唯一可通過胎盤的抗體? ①IgA ②IgE ③IgG ④IgM。
005		有關洗腎病人動靜脈瘻管的護理指導, 下列何者錯誤? ①手術側避免佩戴飾品 ②手術側避免提重物 ③每天須檢查血管通暢性 ④動靜脈瘻管可抽血, 但不可注射藥物。
006		有關收集尿液培養檢體的敘述, 下列何者正確? ①主要目的之一是檢查尿液是否有病毒感染 ②尿液檢體最好在60分鐘內送檢 ③尿液檢體放置過久, 會造成尿液pH值升高 ④若病人有存留導尿管, 則將導尿管與蓄尿袋分離, 再以空針從導尿管開口處抽取尿液檢體。
007		肝臟超音波檢查的主要部位是: ①左腰區 ②右腰區 ③左季肋區 ④右季肋區。
008		在母嬰同室的護理模式下, 為避免新生兒感染, 護理人員及新生兒父母在照護新生兒時, 最重要的防護措施為下列何者? ①穿罩袍 ②戴口罩 ③戴頭套 ④洗手。
009		病人接受開顱手術後, 為預防顱內壓上升, 應避免下列何項活動? ①等長運動 ②圓木翻身法 ③分散護理活動 ④助病人移向床頭時, 請病人呼氣。
010		為尿失禁病人提供之護理措施, 下列敘述何者錯誤? ①避免飲用茶、咖啡等飲料 ②教導要定時解尿 ③隨時保持會陰部乾燥與清潔 ④限制液體量每日1000c. c.。
011		下列何者會造成手指的屈曲? ①掌長肌 ②尺側屈腕肌 ③屈指淺肌 ④橈側屈腕肌。
012		有關排卵期陰道分泌物的特性, 下列何者正確? ①混濁黃白具黏性 ②清澈富有線拉性 ③混濁富有潤滑性 ④透明粉紅富有黏性。
013		有關糖尿病的診斷標準, 下列何者正確? (A)出現多喝、多尿與不預期的體重減輕症狀(B)葡萄糖耐受試驗1小時後血糖值超過200mg/dL(C)禁食超過8小時以上, 血糖值超過126mg/Dl(D)隨機血糖值超過200mg/Dl(E)糖化血色素 (HbA1C) 低於7% ①ABC ②ABD ③ACD ④BDE。

014	有關誘尿的方法，下列何者不適當？①會陰沖洗 ②膀胱部位冷敷 ③手握冰塊 ④聽流水聲。
015	下頷骨與下列何者形成關節？①顴骨 ②上頷骨 ③腭骨 ④顳骨。
016	張女士於1小時前自然分娩出一正常女嬰，正常情況下，張女士此時的子宮底位置應位於何處？①平臍 ②臍上一指 ③恥骨聯合上緣 ④肚臍與恥骨聯合的中點。
017	通常接受化學治療後多久，病人會開始脫髮？①1週內 ②2~3週 ③6~8週 ④半年後。
018	病人的出院準備計畫應由何時開始實施？①出院前1天 ②出院時 ③入院第1天 ④出院前3天。
019	甲狀腺上動脈是下列何者的分枝？①內頸動脈 ②外頸動脈 ③鎖骨下動脈 ④腋動脈。
020	產後第2天新生兒在哭的時候，右上眼瞼會出現紅斑，不哭的時候又消失，護理人員最適當的解釋為何？①「這是新生兒的過敏反應所表現的毒性紅斑，7~10天後會自然消失。」 ②「這是生產壓迫所導致的臉部瘀傷，7~10天就會自然消失。」 ③「這是因為毛細管擴張而形成的毛細管擴張痣，多數在1歲半以前會自然褪去。」 ④「這是蒙古斑，對人體沒有害處，多數在學齡前期會自然褪去。」。
021	下列何者是糖尿病人失明最主要的原因？①視神經傳導障礙 ②眼壓持續上升 ③視網膜病變 ④虹彩增生病變。
022	有關糞便顏色的敘述，下列何者錯誤？①綠色的糞便可能為腸道感染 ②食用甜菜會使糞便成黑色 ③服用鐵劑會使糞便成柏油色 ④膽道阻塞時，會有灰白色糞便。
023	下列何者的收縮不牽動肩關節？①背闊肌 ②三角肌 ③胸鎖乳突肌 ④斜方肌。
024	正常情況下，下列何種姿勢最無助於產程進展？①平躺 ②蹲姿 ③坐姿 ④側臥。
025	全身性紅斑性狼瘡病人，接受脈衝式藥物治療的藥物指導，下列何者錯誤？①注意感染徵象 ②口服藥物宜於餐前服用 ③鼓勵食用高鈣和低鈉飲食 ④停藥時，應採漸進式停藥。
026	排便反射作用主要是受下列何部位的神經所控制？①L4-L5腰神經 ②S2-S4薦神經 ③T1-T12胸神經 ④C1-C2頸神經。
027	在心臟腔室中，心肌層最厚的是：①左心房 ②右心房 ③左心室 ④右心室。
028	下列何項產前運動，有助強化骨盆底肌肉？①胸式呼吸 ②腰背伸展運動 ③凱格爾氏運動 ④肩膀運動。

029	有關結腸鏡檢查之護理措施，下列何者錯誤？①檢查前2天，需採用低渣飲食 ②檢查當天需禁早餐 ③檢查中，病人採截石術姿位 ④檢查後，需觀察有無出血、腹脹現象。
030	有關水劑藥物的準備，下列何者錯誤？①給藥前需將藥液搖勻 ②倒藥時藥杯與視線保持平行 ③以液面最凸點為測量標準 ④倒完藥液後藥物瓶口應以衛生紙由上往下擦拭。
031	當尿液離開大腎盞，會進入下列何處？①腎竇 ②腎盂 ③小腎盞 ④集尿管。
032	下列何者為罹患乳癌的高危險群？①母親或外祖母在60歲前得乳癌 ②早生育及早停經者 ③初經較晚者 ④家族女性曾罹患乳房纖維囊腫病史者。
033	有關「去大腦僵直姿勢（decerebraterigidity）」的主要特徵，下列何者正確？①上肢屈曲，下肢伸展，足部外旋 ②上肢伸展，下肢屈曲，足部內旋 ③上肢伸展，下肢伸展，足部內旋 ④上肢屈曲，下肢屈曲，足部外旋。
034	接受血小板靜脈輸注之注意事項，下列敘述何者正確？①輸注時，若為血小板濃厚液時，以每5分鐘輸入1單位為標準 ②必須慢慢輸注，以免發生輸血反應 ③若無法馬上輸注，可將血小板暫存於病房冰箱備用 ④一般可在室溫下保存21天。
035	鼻淚管開口於鼻腔的：①蝶篩隱窩 ②上鼻道 ③中鼻道 ④下鼻道。
036	李太太入院待產時必須執行的護理措施不包括下列何者？①量體溫 ②量血壓 ③聽胎心音 ④告知禁食。
037	脊髓損傷病人發生自主神經過度反射（autonomicdysreflexia）現象時之護理措施，下列何者正確？①協助病人平躺 ②找出刺激源並移除 ③給與大量點滴補充 ④停止所有藥物使用。
038	靜脈輸液套管內出現一大段空氣之處理，下列何者為首要步驟？①抬高注射部位 ②關閉管夾 ③將輸液管拉直輕彈 ④使用原子筆纏繞輸液管。
039	輸卵管的上皮組織是屬於：①單層鱗狀上皮 ②單層柱狀上皮 ③複層鱗狀上皮 ④複層柱狀上皮。
040	新生兒行為狀態為呼吸規律、身體動作少、眼睛張大且明亮、對刺激有反應。此表示新生兒處於下列何種時期？①活動睡眠期 ②昏昏欲睡期 ③安靜清醒期 ④活動清醒期。
041	有關暫時缺血性發作（TIA）之敘述，下列何者錯誤？①所有中風之病人，均會有此經歷 ②是一種可回復性的神經功能障礙 ③可持續數秒至24小時之久 ④主因暫時性、局部性之腦部缺血現象所造成。
042	有關一般靜脈輸液主要目的，下列敘述何者正確？①降低體溫 ②補充體液及電解質 ③減輕疼痛 ④緩解焦慮。

043		在腹骨盆腔的九個區域中，大部分的胃位於：①右季肋區 ②左季肋區 ③腹上區 ④臍區。
044		有關產前會陰按摩的敘述，下列何者正確？①第2孕期即可開始執行 ②可使用嬰兒油或甘油來促進按摩 ③剛開始會陰感到微熱、刺痛是異常的 ④按摩時將兩個拇指放入陰道內約5公分。
045		有關上腸胃道內視鏡檢查前準備與檢查後護理，下列何者錯誤？①檢查前禁食6~8小時，並取得同意書 ②檢查前給與Atropine，以減少唾液分泌 ③檢查前使用喉部局部麻醉劑，以抑制作嘔反射 ④檢查後禁食6~8小時，即可開始嘗試喝水。
046		護理人員正確給藥的職責包括：A與醫師討論存疑的醫囑B協助醫師調劑C評值藥物之作用與觀察副作用D未澄清的醫囑拒絕給藥①ABC ②ABD ③ACD ④BCD。
047		肝三連物（Portaltriad）不包括：①膽管 ②肝動脈的小分枝 ③肝門靜脈的小分枝 ④中央靜脈。
048		產婦由子宮下段橫式剖腹產生下一女嬰，返回病房時，腹部使用束腹帶，此時使用束腹帶的目的為：①緊縮腹部肌肉，以達塑身效果 ②支托腹部肌肉，減少下墜感 ③減輕傷口牽引的疼痛 ④壓迫傷口，避免出血。
049		下列何種型態之肝炎病毒必須與B型肝炎病毒共生？①A型 ②C型 ③D型 ④E型。
050		執行眼藥水滴入法，藥水應滴入下列何部位？①上眼瞼內 ②角膜 ③眼角 ④結膜下穹窿。
051		下列何者不是腸繫膜上動脈的分枝？①左結腸動脈 ②中結腸動脈 ③右結腸動脈 ④迴腸結腸動脈。
052		會陰切開術常於何時執行？①胎頭下降高度為+1時 ②子宮頸全開 ③子宮頸變薄100% ④胎頭著冠時。
053		重症肌無力病人的護理措施，下列何者正確？①教導病人下巴朝向胸部時，才進行吞嚥動作 ②觀察病人是否發生藥物劑量過量而發生「肌無力危象（myastheniccrisis）」 ③觀察病人是否發生腹部抽筋及便秘之「膽鹼激素危象（cholinergiccrisis）」 ④教導病人可能須長期服用高劑量之腎上腺皮質類固醇，以維持日常生活之活動。
054		有關管灌飲食的敘述，下列何者錯誤？①溫度：37.8~40.5℃ ②高度：液面與胃距離15~20cm ③每次灌食量：250~300c. c. ④每次灌食時間：15~20分鐘。
055		下列何者發出「節前交感神經纖維」？①整個脊髓的灰質 ②C1-T12脊髓 ③T1-L2脊髓 ④T1-L5脊髓。
056		懷孕期間泌乳素是由何處所分泌的？①腦下垂體前葉 ②腦下垂體後葉 ③胎盤絨毛外層 ④黃體與蛻膜。

057	手術後傷口感染容易導致下列何種疝氣？①股疝氣 ②臍疝氣 ③切口疝氣 ④絞扼性疝氣。
058	下列何種飲食適用於無法由口咀嚼或吞嚥食物的病人？①清流質飲食 ②全流質飲食 ③軟質飲食 ④細碎飲食。
059	下列何者與聽覺反射有關？①上丘 ②下丘 ③耳蝸神經核 ④紅核。
060	子宮頸黏液塞（mucousplug）為何能減少孕期生殖道的感染？①產生制菌素 ②刺激血漿蛋白量增加 ③形成栓子防止細菌侵入 ④產生溶菌素。
061	指導病人回家自我照顧肩部人字形石膏的方法，下列何者正確？①石膏外表弄髒時，可用濕布擦乾淨 ②石膏有斷裂現象時，可用寬膠布貼起來 ③石膏弄濕時，可用烤燈或吹風機加速吹乾 ④抓住石膏橫把以協助翻身。
062	有關正常呼吸的敘述，下列何者錯誤？①潮氣容積約500~700c. c. ②呼吸速率約12~20次/分鐘 ③吸氣與呼氣的比率約3：2 ④呼吸與脈搏的比例約1：4。
063	位於中樞神經系統血管旁的膠細胞，最可能是下列何者？①星狀膠細胞 ②微小膠細胞 ③寡樹突膠細胞 ④許旺氏細胞。
064	下列何項胎兒健康之評估，不具侵入性危險？①羊膜穿刺 ②胎兒鏡 ③臍帶血採樣 ④杜卜勒血流超音波。
065	下列敘述何者顯示胃食道逆流（GERD）病人對護理指導已有正確的了解？①「吃完飯後，我最好躺下來休息。」 ②「就寢前喝熱牛奶，以幫助睡眠。」 ③「我可以穿緊一點的衣服，來控制食量。」 ④「我最好將床頭抬高15~20公分左右。」。
066	下列那些情況會導致呼吸過緩？A顱內壓升高B酮酸中毒C服用嗎啡過量D發燒①AB ②AC ③BC ④BD。
067	下列何者不含軟骨？①滑液（膜）關節 ②主支氣管 ③椎間盤 ④軟腭。
068	孕婦常會有低血比容的原因是：①血球增加多於血量增加 ②血球增加低於血量增加 ③鐵質不足 ④靜脈回流減少。
069	有關上石膏病人的護理措施，下列何者錯誤？①注意肢體感覺的變化 ②鼓勵執行等張運動 ③定時評估膚色 ④鼓勵多攝取纖維食物。
070	下列何者是冰枕、熱水袋、酒精拭浴、冷熱敷達到其治療目的之主要機轉？①傳導 ②對流 ③轉換 ④輻射。
071	下列何者能控制眼球的共軛運動（Conjugatemovement）？①顳葉 ②額葉 ③枕葉 ④頂葉。

072	有關母乳的敘述，下列何者錯誤？①母乳的脂肪有助於嬰兒視網膜的生長 ②母乳中含有抗病毒因子 ③母乳的乳糖對於嬰兒的腦部成長有助益 ④母乳中的鐵質被嬰兒吸收的程度與配方奶粉相同。
073	有關巴金森氏症病人症狀的敘述，下列何者正確？①震顫常伴有大拇指對手指的「搓藥丸（pill-rolling）動作」 ②多數個案變成失智症（dementia） ③剛開始走路時，兩腿僵硬 ④病情惡化時，說話變快且大聲。
074	下列情況，何者不適用熱水坐浴療法？①直腸手術後病人 ②痔瘡病人 ③不明原因腹痛病人 ④自然生產後婦女。
075	由胃進入小腸的食糜在小腸內被何種鹼性物質中和其酸性？① ② ③ $2\text{-HPO}_4$ ④ $\text{HCO}_3^- + \text{NH}_4^+$ 。
076	吳女士產後打算持續哺餵母乳至少6個月，產後初期不適合使用的避孕方式為何？①子宮內避孕器 ②口服避孕藥 ③保險套 ④結紮。
077	下列何者不會降低肝昏迷病人的血清氨濃度？①給與Lactulose藥物治療 ②限制蛋白質攝取量 ③避免便秘 ④限制水分攝取。
078	下列那一情況會增加用冷治療的危險性？①雷諾氏症候群 ②口腔疼痛 ③體內裝置心臟節律器者 ④關節扭傷24小時內。
079	吸氣時的肺臟擴張會刺激牽張接受器（Stretchreceptor），其神經衝動經由迷走神經傳至延髓與橋腦，因而抑制吸氣並轉為呼氣。此作用稱為：①呼吸自主調控（Respirationautoregulation） ②法蘭克-史達林呼吸律（Frank-Starlinglawofrespiration） ③赫-鮑二氏膨脹反射（Hering-Breuer'sinflationreflex） ④拉普拉斯反射（Laplace'sreflex）。
080	產婦想到新生兒或聽到新生兒哭聲時，就會感覺奶脹，乳汁會噴出，主要是何種荷爾蒙的作用？①催產激素（oxytocin） ②泌乳激素（prolactin） ③動情素（estrogen） ④黃體素（progesterone）。
081	下列何者是引發心肌梗塞病人呈現心因性休克的原因？①心臟收縮力減少 ②感染導致心輸出量減少 ③全身循環血流量減少 ④低容積導致心輸出量減少。
082	約束個案肢體，末梢循環應多久觀察一次？①15~30分鐘 ②1小時 ③2小時 ④4小時。
083	小腸中將食糜與消化液混合之主要運動為：①分節收縮（Segmentationcontraction） ②蠕動（Peristalsis） ③團塊運動（Massmovement） ④袋狀收縮（Haustriation）。
084	護理人員需注意當產婦有下列那種情形時，是不合適給與Ergonovine（麥角鹼類）的藥物？①低血壓 ②高血壓 ③呼吸加速 ④呼吸變慢。

085	下列何者是慢性胃炎導致胃癌的原因？①胃部萎縮性改變 ②胃酸分泌過多 ③胃黏膜屏障受損 ④長期慢性炎症。
086	一般而言，年齡與所需睡眠時間的關係為何？①隨年紀增加而增加 ②隨年紀增加而減少 ③20歲達高峰之後遞減 ④50歲達高峰之後遞減。
087	下列何者為副交感神經興奮時產生之作用？①增加心跳率 ②降低心跳率 ③增加傳導速率 ④增加收縮強度。
088	孕婦所呈現之下列症狀，何項經臥床休息或經由醫師處方輔以黃體素治療後，有時能避免流產？①陰道點狀出血、子宮頸關閉且無變薄變軟 ②胚胎無心搏動、陰道出現褐色分泌物，但子宮頸仍關閉 ③子宮頸內口擴張，且羊膜破裂 ④胚胎組織未完全排出，流血及陣痛持續不停。
089	有關全胃切除手術後，出現惡性貧血合併症之機轉，下列何者正確？①胃酸分泌減少 ②胃蛋白酶分泌減少 ③迷走神經刺激降低 ④內在因子分泌減少。
090	使用於背部護理之酒精濃度，下列何者正確？①30% ②50% ③70% ④90%。
091	下列何者為近腎絲球器（Juxta-glomerular apparatus）偵測體液中鈉離子濃度變化的構造？①緻密斑（Macula densa） ②松果體（Pineal body） ③脈絡叢（Choroid plexus） ④逆流放大器（Counter-current amplifier）。
092	有關增加母乳量之方式，下列何者錯誤？①多補充水分 ②補充人參及生麥芽水 ③餵奶時保持心情愉快，精神放鬆 ④若孩子有需要可隨時哺餵。
093	下列何者不是接受全髖關節置換術後發生脫位的徵象？①疼痛度增加 ②患肢變長 ③患肢內外旋 ④活動度降低。
094	下列何種關節僅可以做屈曲和伸展兩種關節運動？①膝關節 ②腕關節 ③踝關節 ④髖關節。
095	下列何種類型的血管在人體內分布的總截面積最大？①大動脈 ②大靜脈 ③微血管 ④小靜脈。
096	林太太妊娠31週，因大量破水而入院，相關檢查之敘述，下列何者錯誤？①用陰道鏡檢查可見羊水自子宮頸流出 ②以石蕊試紙測試流出之液體，石蕊試紙變為紅色 ③羊齒狀結晶試驗可見羊齒樹葉狀結晶反應 ④超音波檢查羊水減少。
097	有關幽門螺旋桿菌感染導致消化性潰瘍之確立性診斷檢查，下列何者錯誤？①胃鏡組織切片檢查 ②尿素呼氣試驗（urea breath test） ③上腸胃道攝影術 ④血清抗體IgG檢測。
098	有關院內感染的敘述，下列何者錯誤？①是指病人住院中得到的感染 ②不包括住院前就已經潛伏的感染 ③不包括病人出院24小時內出現症狀的感染 ④包括病人入院後到出院前就已經潛伏的感染。

099	下列何者不屬於顆粒性白血球？①單核球 ②嗜中性球 ③嗜酸性球 ④嗜鹼性球。
100	新生兒罹患下列那一種先天性代謝異常疾病，不能哺餵母乳？①高胱胺酸尿症 ②甲狀腺功能低下症 ③半乳糖血症 ④苯酮尿症。
101	護理人員建議骨質疏鬆症病人在補充鈣質時，宜同時補充下列何者？①維生素A ②維生素B ③維生素C ④維生素D。
102	下列何者為病人健康資料的最佳來源？①醫師 ②病歷紀錄 ③個案本身 ④家屬及親友。
103	下列何部位是臨床上常用以抽取腦脊髓液檢查的位置？①第一與第二腰椎之間 ②第三與第四腰椎之間 ③第三腦室 ④大腦導水管。
104	有關先天性甲狀腺功能低下症診斷性檢查值之敘述，下列何者正確？①甲狀腺素（thyroxine）下降、促甲狀腺素（TSH）上升 ②甲狀腺素（thyroxine）上升、促甲狀腺素（TSH）下降 ③肌酸磷酸激酶（creatinephosphokinase）下降、甲狀腺素T3及T4值上升 ④沒有抗甲狀腺抗體（antithyroidantibodies）、促甲狀腺素（TSH）下降。
105	有關腔隙症候群（compartmentsyndrome）的敘述，下列何者錯誤？①是嚴重的骨折合併症 ②主因為出血及水腫的壓迫 ③骨切開術可緩解症狀 ④不作處理，會導致肢體功能喪失。
106	下列何者為因輸血而感染愛滋病（AIDS）的傳染途徑？①直接接觸傳染 ②間接接觸傳染 ③媒介傳染 ④交互傳染。
107	有關陰莖勃起的敘述，下列何者錯誤？①青春期前陰莖也會勃起 ②主要是陰莖動脈舒張引起 ③交感神經衝動引起 ④副交感神經衝動引起。
108	下列那一項是妊娠28週出生的早產男嬰身體外觀的特徵？①皮膚較薄，胎毛較少 ②陰囊無皺褶，睪丸未降至陰囊 ③腳底有許多皺褶 ④四肢屈曲，肌肉張力弱。
109	下列何者不是心肌梗塞病人性活動前的適當措施？①服用硝化甘油（NTG） ②飲用酒精 ③前戲愛撫 ④溫水淋浴。
110	下列何者不是長期醫囑（standingorder）？①Ampicillin1#（250mg）P.O.q6h ②Demerol50mgI.M.q4hp.r.n. ③Glycerinenema100mLS.O.S. ④Ativan1#（0.5mg）P.O.h.s.。
111	下列何者促進動情素分泌？①濾泡刺激素 ②黃體素 ③鬆弛素 ④前列腺素。
112	依據丹佛Ⅱ嬰幼兒發展篩檢測驗（DDST-Ⅱ），下列何者是18個月的幼兒可以通過的項目？①自己走得很穩 ②舉手過肩丟球 ③會踏動三輪車 ④會疊6塊積木。



113	使用柺杖輔助行走時，下列何者正確？①以柺杖支撐身體重量 ②柺杖手把的位置，宜使肘部保持屈曲15° ③柺杖的長度是站立時腋下2~3指幅至地面垂直長度 ④宜穿著拖鞋，以方便穿脫。
114	林小姐告訴你說：「我覺得腳扭傷時，中醫治療比西醫治療有效」，此時運用下列何項會談技巧較為適宜？①讚賞 ②不批評 ③沉默 ④質問。
115	某神經纖維的絕對不反應期為5毫秒，此神經纖維理論上最快每秒鐘可產生幾次動作電位？①20次 ②50次 ③200次 ④500次。
116	水痘之傳染途徑為何？①飛沫傳染 ②血液傳染 ③腸道傳染 ④胎盤垂直傳染。
117	有關脂肪栓塞的臨床表徵，下列何者錯誤？①呼吸困難 ②呼吸過速 ③瘀斑性的皮膚疹 ④心搏過慢。
118	下列何者為治療處方註明的「O.D.」？①左耳 ②右耳 ③左眼 ④右眼。
119	下列那種賀爾蒙可以促進蛋白質異化作用？①腎上腺皮質素 ②生長激素 ③甲狀腺素 ④胰島素。
120	以手指輕觸新生兒臉頰，新生兒會將頭轉向刺激源，同時出現張開嘴巴的動作，稱為：①尋乳反射（rootingreflex） ②擁抱反射（mororeflex） ③頸部強直反射（tonicneckreflex） ④吸吮反射（suckingreflex）。
121	有關慢性中耳炎行乳突手術的術後護理指導，下列何者正確？①術後幾日出現顏面神經麻痺是正常現象 ②敷料移除後即可正常洗頭及搭飛機外出旅遊 ③術後幾週應避免彎腰、提重物及擤鼻涕 ④應以高聲說話的方式，增進溝通。
122	有關安全防護措施敘述，下列何者錯誤？①隨時維持安全通道的通暢 ②儲備足量的急救用藥品與器材 ③定期檢測建築物基本結構，龜裂時應重新油漆 ④化學藥品應分類存放，以防危險。
123	健康的成年人在靜止時，每分鐘的呼吸次數約為多少次？①120 ②70 ③36 ④12。
124	正常情況下，嬰兒循環系統中，卵圓孔永久實質的關閉是在出生後多久？①2~3天 ②1~2個月 ③3~4個月 ④5~8個月。
125	有關白內障的敘述，下列何者正確？①因眼內壓異常上升而造成 ②使用眼底鏡檢查紅光反射扭曲或消失 ③出現視力模糊、眼睛疼痛症狀 ④囊內白內障摘除術是主要治療方式。
126	有關預防給藥錯誤的方法，下列敘述何者錯誤？①給藥必須要有醫囑 ②發藥時要稱呼病人全名 ③麻醉藥物需放置於加鎖的藥櫃中 ④過期未超過3天的藥物尚可服用。
127	降鈣素（Calcitonin）主要由下列何種細胞所分泌？①甲狀腺濾泡旁細胞 ②甲狀腺濾泡細胞 ③副甲狀腺主細胞 ④副甲狀腺嗜酸性細胞。

128	護理下列何種傳染病病人不須戴口罩？①水痘 ②腮腺炎 ③麻疹 ④破傷風。
129	有關扁桃腺切除術後之護理指導，下列何者錯誤？①指導病人冰敷兩側上頸部72小時，以減輕疼痛及止血 ②指導病人每日數次以溫涼的生理食鹽水漱口 ③指導病人24小時後，可開始進食冰冷流質飲食 ④指導病人勿用力咳嗽，以防出血。
130	利用視聽觸叩得知的病人狀況，是屬於下列何種觀察法？①旁觀性觀察 ②自省性觀察 ③直接觀察法 ④參與性觀察法。
131	有關嗅覺的敘述，下列何者錯誤？①需經過視丘傳到大腦皮質 ②具有快適應作用 ③嗅覺細胞為一種雙極神經元 ④嗅覺細胞含有氣味分子結合蛋白。
132	有效執行胸腔物理療法之順序為何？①噴霧治療②抽痰③姿位引流、拍背叩擊①①→②→③ ②②→①→③ ③①→③→② ④③→②→①。
133	有關青光眼的臨床表徵，下列何者正確？A眼睛疼痛B虹彩光圈視覺C閃光幻視D周邊視野消失E視野出現浮動的黑點①ABC ②ABD ③BCD ④CDE。
134	依據哈佛腦死標準，下列何者不能作為死亡判定的依據？①腦波圖呈一直線 ②心跳停止、瞳孔放大 ③無自然呼吸、無肌肉活動 ④對刺激無感受、無反應。
135	有關肺循環及肺內氣體交換之敘述，下列何者錯誤？①肺動脈血為缺氧血 ②肺動脈內二氧化碳分壓約為45mmHg (PaCO <sub>2</sub> =45mmHg) ③肺泡氧分壓約為110mmHg ④經過肺泡換氣後，肺動脈內氧分壓約為100mmHg。
136	李小妹罹患先天性乳糖酶缺乏症，護理人員指導母親餵食應注意事項，下列何者正確？①「不需特別注意，長大就好了。」 ②「不可喝優酪乳。」 ③「應補充鐵質。」 ④「以豆奶或米漿來代替牛奶及母乳。」。
137	接受全喉切除術的病人於術後不會喪失下列那種身體功能？①原有呼吸氣道 ②正常發聲 ③味覺 ④嗅覺。
138	護理腹瀉的病人時，最重要的目標是避免病人發生下列何種情形？①全身虛弱無力 ②體液電解質的不平衡 ③肛門周圍皮膚疼痛 ④體重下降。
139	胃腺分泌氫離子 (H <sup>+</sup> ) 的機制主要是透過：①H <sup>+</sup> /K <sup>+</sup> 幫浦 (H <sup>+</sup> /K <sup>+</sup> ATPase pump) ②H <sup>+</sup> /Na <sup>+</sup> 幫浦 (H <sup>+</sup> /Na <sup>+</sup> ATPase pump) ③H <sup>+</sup> /Ca <sup>2+</sup> 幫浦 (H <sup>+</sup> /Ca <sup>2+</sup> ATPase pump) ④H <sup>+</sup> /Cl <sup>-</sup> 幫浦 (H <sup>+</sup> /Cl <sup>-</sup> ATPase pump)。
140	在為新生兒注射卡介苗時，應選擇的注射方式及部位為：①皮內注射於左上臂三角肌中央部位 ②皮下注射於左上臂三角肌中央部位 ③皮下注射於上臂外側 ④肌肉注射於股外側肌。
141	有關心絞痛臨床表徵的敘述，下列何者錯誤？①休息時胸痛加劇 ②運動時胸痛加劇 ③激動時胸痛加劇 ④疲勞時胸痛加劇。

142	陳先生血糖不穩定，order：q. o. d. checkF/S，此表示應多久測1次血糖？①每天 ②每小時 ③每4小時 ④每2天。
143	下列何種化學物質可以不藉蛋白質等載體之協助，自行擴散通過脂質細胞膜？① 二氧化碳 ②鈉離子 ③鈣離子 ④葡萄糖。
144	有關急性細支氣管炎的敘述，下列何者正確？①是學齡期兒童常見的上呼吸道感染 ②最常見的致病因是細菌感染 ③主要傳染途徑為接觸傳染，需採取隔離措施 ④呼吸困難嚴重之病童，會出現呼吸性酸中毒現象。
145	高血壓病人較適合攝取下列何種食物？①煙燻香腸 ②西瓜切片 ③榨菜麵湯 ④乳酪蛋糕。
146	在人際關係發展的週期中，下列何者為「護理人員與病人主動參與健康問題的確 立」的階段？①介紹前期 ②介紹期 ③工作期 ④結束期。
147	下列何者源自於巨核細胞（Megakaryocyte）？①嗜中性球 ②單核球 ③淋巴 球 ④血小板。
148	原本健康的嬰兒，突然尖叫、哭鬧、雙膝屈曲縮腹，嘔吐且大便中含血及黏膜， 哭鬧減緩時，可在右上腹摸到香腸狀腫塊，可能是下列何種疾病？①臍疝氣 ② 腸套疊 ③巨結腸症 ④幽門狹窄。
149	下列何者不是腹主動脈瘤破裂的典型臨床表徵？①腹部腫塊 ②後背疼痛 ③血 壓下降 ④尿量增加。
150	臨床上注射結核菌素試驗後，下列何者為觀察反應的時間？①1小時以內 ②4~6 小時 ③12~24小時 ④48~72小時。
151	腎臟的近曲小管有豐富的何種胞器，以進行主動運輸？①粒線體 ②溶酶體 ③ 中心體 ④過氧化體。
152	有關急性風濕熱病童的護理措施，下列何者不適當？①限制水分攝取，以減少心 臟負荷 ②急性期採絕對臥床休息，並限制活動 ③使用床上支架，以減少被褥 的壓力 ④鼓勵少量多餐，增加蛋白質及熱量的攝取。
153	接受鈣離子拮抗劑Adalat（nifedipine）治療的病人應隨時監測下列那一項變 化？①血壓 ②尿量 ③視力 ④聽力。
154	病人輸血前，除做交叉試驗外，還需檢查那些項目？(A)血液電解質之成分 (B)ABO血型(C)白血球分類(D)Rh因子(E)血容積比率①AC ②BD ③CD ④DE。
155	有關 $\beta$ 受體拮抗劑之臨床用途，下列何者錯誤？①降血壓 ②治療心絞痛 ③抗 心律不整 ④治療氣喘。

156	容易發生缺鐵性貧血的年齡層，下列何者除外？①出生後2~3個月的早產兒 ②6~24個月大的嬰幼兒 ③學齡期兒童 ④青春期的女孩。
157	下列何者是導致長期接受靜脈輸液病人發生靜脈血栓的主要原因？①凝血作用增強 ②靜脈管徑變粗 ③靜脈血流停滯 ④靜脈管壁受損。
158	林太太手術後第1天，需接受靜脈點滴注射，醫囑為D5W500c. c. +KCL10mEq及D5S1500c. c. I. V. q. d.，若採用普通輸液套管，下列何者為每分鐘應保持的滴數？①13滴 ②21滴 ③33滴 ④50滴。
159	下列何者適用於治療帕金森氏症（Parkinson disease）？①多巴胺（Dopamine）抑制劑 ② $\gamma$ -胺丁酸（GABA）促進劑 ③中樞抗膽鹼（Anticholinergic）藥物 ④中樞神經興奮劑。
160	下列那一項不屬於川崎氏症（Kawasaki disease）之診斷標準？①嘴唇乾裂及草莓舌（fissured lip and strawberry tongue） ②關節痛或關節炎 ③四肢末梢紅腫，手腳掌脫皮 ④持續發燒達5天以上。
161	下列何種脂蛋白具有預防冠狀動脈疾病的功能？①乳糜微粒 ②高密度脂蛋白 ③低密度脂蛋白 ④極低密度脂蛋白。
162	下列那些為脫水之症狀與徵象？A皮膚飽滿度減少B口腔黏膜乾燥C體溫上升D血壓上升①ABD ②ABC ③ACD ④BCD。
163	有關肌肉之敘述，下列何者正確？①骨骼肌受意識控制，平滑肌不受意識控制 ②骨骼肌不受意識控制，平滑肌受意識控制 ③骨骼肌與平滑肌皆受意識控制 ④骨骼肌與平滑肌皆不受意識控制。
164	有關尿道下裂兒童手術的相關護理，下列敘述何者錯誤？①向父母解釋，最適合手術的時機是在學齡期 ②提醒父母及兒童術後需臥床，肢體活動會受限制 ③運用床上支架，以避免壓迫到手術的部位 ④安排床邊靜態活動，以轉移兒童活動受限的不適感。
165	鉅201（ <sup>201</sup> Tl）心肌閃爍圖測試前，下列何者病人需暫停食用？①海鮮 ②肉類 ③牛奶 ④咖啡。
166	有關全靜脈營養療法（TPN）的合併症，下列何者錯誤？①空氣栓塞 ②敗血症 ③高血糖 ④低血鉀。
167	下列何種藥物不用於氣喘的治療？①Glucocorticoids ②Salbutamol ③Terbutaline ④Propranolol。
168	孩童接受Dexamethasone肌肉注射，醫囑劑量為7.5mg，此藥每瓶5mg/mL。護理人員應該注射的量為多少mL？①1 ②1.5 ③2 ④2.5。

169	降低飲食中脂肪的含量，有助於減少下列何種癌症的產生？①腦癌 ②胃癌 ③結腸癌 ④肝癌。
170	體溫調節反應器包括下列那些？A血管B下視丘C汗腺D骨骼肌E皮膚①ABC ②ACD ③BCD ④CDE。
171	有關Histamine受體的敘述，下列何者正確？①H1受體與胃酸分泌有關 ②H2受體與過敏有關 ③H3受體與中樞神經傳導有關 ④H1、H2、H3受體皆與過敏有關。
172	有關腎病症候群的臨床特徵，下列何者錯誤？①水腫 ②高血脂 ③高血壓 ④蛋白尿。
173	下列何者對放射線治療最敏感？①橫紋肌 ②神經 ③軟骨 ④骨髓。
174	吳先生診斷為buccalcancer，頰部、耳部及頸部有多處轉移腫塊，不時的流出惡臭分泌物，護理人員依醫囑q. d. & p. r. n. 換藥，協助吳先生測量體溫時，最適宜採用下列何種方式？①口溫 ②耳溫 ③腋溫 ④額溫。
175	下列何種藥物稱為中樞性骨骼肌鬆弛劑，可用於治療肌肉痙攣、痙攣？①Chlorzoxazone ②Atracurium ③Succinylcholine ④Gallamine。
176	護理人員在為正常足月新生兒評估神經系統的功能時，下列何者為正常的檢查結果？①平舉新生兒，迅速將其放低15公分，新生兒手臂會先抱向中線，頭後仰 ②新生兒仰臥，施壓於兩隻手掌，其頭會偏向一側，口緊閉，眼張大 ③給予大的聲音刺激時，新生兒會出現單側肢體外展，且手肘彎曲握拳的姿勢 ④由足跟輕畫腳底外側至腳趾根部時，新生兒的大拇趾往上翹，其餘四趾扇形張開。
177	有關缺鐵性貧血之敘述，下列何者正確？①病因包括胃腸道出血和潰瘍性結腸炎 ②又稱為惡性貧血 ③血液檢查發現平均血球容積（MCV）及全鐵結合能力（TIBC）都增加 ④常見的症狀為湯匙狀指甲、皮膚瘀斑。
178	有關選擇靜脈注射部位，下列何者正確？①長期靜脈輸注宜使用近端的大靜脈 ②輸血治療宜選取較大的靜脈 ③為使輸液順暢，宜選擇肌肉較發達、活動較多的手臂靜脈 ④暫時性的靜脈輸注宜選用下肢靜脈。
179	使用毛地黃治療心衰竭時，須特別注意血液中何種離子的濃度，以避免中毒？①鈉離子 ②鉀離子 ③鈣離子 ④氯離子。
180	有關特發性血小板減少紫斑症（ITP）的照護，下列敘述何者錯誤？①生活周遭環境需注意安全，預防受傷引起出血 ②一旦發燒時，儘快給與Aspirin以降溫 ③避免感染，必要時可給與預防性抗生素 ④血小板低於10,000/mm <sup>3</sup> 時，只適宜進行靜態活動。
181	有關慢性阻塞性肺疾病病人使用氧氣療法之敘述，下列何者正確？①給與FiO <sub>2</sub> 60%氧氣 ②維持SaO <sub>2</sub> 大於90% ③使用氧氣流量6L/min ④維持PaCO <sub>2</sub> 於35mmHg。

182	為避免發生無音區而造成高血壓病人血壓值被低估的危險，應如何測量血壓？①打氣至140mmHg才開始聽血壓值 ②打氣至180mmHg才開始聽血壓值 ③打氣至橈動脈搏動消失後，繼續向上打氣10mmHg才開始聽血壓值 ④打氣至橈動脈搏動消失後，繼續向上打氣30mmHg才開始聽血壓值。
183	Sodiumvalproate可增加腦中何種神經傳遞物質濃度？①GABA ②Glycine ③Acetylcholine ④Glutamate。
184	有關脊柱側彎流行病學的敘述，下列何者正確？①好發於早產兒 ②好發於學齡前男孩 ③常見於青春期的女孩 ④男孩發生率高於女孩。
185	有關結核菌素皮膚試驗結果之判讀，下列何者正確？①應記錄皮膚下硬結的直徑大小 ②應在注射後48至72小時之間記錄1次 ③皮膚發紅直徑大於2公分，稱為陽性反應 ④陽性反應之病人須立即接受呼吸道隔離。
186	有關脈搏速率的敘述，下列何者錯誤？①女性比男性脈率稍快 ②體表面積愈大，脈率愈快 ③平躺時脈率低於站立時 ④嚴重且無法緩和的疼痛脈率會變慢。
187	下列何種祛痰藥之作用機轉為破壞濃痰內分子的雙硫鍵（disulfidebond），減少痰的黏滯度？①Terpinhydrate ②Ammoniumchloride ③Acetylcysteine ④Guaifenesin。
188	有關水腦病童接受腦室腹膜分流手術（V-Pshunt），手術前後的護理，下列敘述何者錯誤？①手術前應觀察病童意識狀態，以做為評估顱內壓升高之指標 ②2歲以下病童，手術前應注意頭圍大小的變化 ③手術後應限制水分，並記錄輸入及輸出量 ④手術後應躺向接受手術那一側，以避免腦脊髓液迅速減少。
189	下列那項檢查結果最能代表腎功能狀態？①尿液分析 ②血尿素氮 ③血清肌酸酐 ④肌酸酐清除率。
190	有關影響「冷熱應用」效應的敘述，下列何者正確？①使用於皮膚表層時，熱比冷敏感 ②使用時間長，耐受力會增加，敏感度降低 ③皮膚較厚處，對冷熱的敏感度大 ④使用面積小者，效果及反應較大。
191	下列何者成癮性最低？①Codeine ②Pethidine ③Morphine ④Methadone。
192	小華因頭痛疑似腦膜炎，準備做腰椎穿刺以確定診斷，有關腰椎穿刺的敘述，下列何者錯誤？①穿刺時協助小華採側臥蝦米狀姿勢 ②穿刺部位為第3及第4腰椎之間 ③穿刺後應鼓勵小華翻身或下床活動 ④穿刺後應安排較暗且安靜之環境。
193	有關氣喘的檢查數據，下列何者錯誤？①尖峰吐氣流速（PEFR）下降 ②功能肺餘容積（FRC）下降 ③持續惡化時，二氧化碳分壓（PaCO <sub>2</sub> ）增加 ④過敏性氣喘會出現嗜伊紅性白血球增加。
194	冷療法無法達到下列何種治療目的？①肌肉鬆弛 ②止血 ③止痛 ④抑制炎症反應。

195	針對不孕症的婦女，下列何種藥物可透過抑制泌乳素的分泌而增加女性生育能力？①HCG ②Clomiphene ③HMG ④Bromocriptine。
196	以三級預防概念來看，下列何者為精神衛生護理人員在次級預防中的工作項目？①協助有自傷之虞的精神病人，接受強制就醫治療 ②舉辦心理健康講座，促進心理功能 ③輔導職能復健，增進其功能 ④民眾心理諮詢。
197	有關副甲狀腺功能低下之敘述，下列何者正確？①因高血鈣出現Chvostek's徵象，導致肌肉痙攣 ②因低血磷出現Trousseau's徵象，導致手指顫抖 ③因急性抽搐，導致咬傷舌頭及呼吸道阻塞 ④因身體出現酸中毒，導致手足抽搐症狀惡化。
198	在收集到的資料中，下列何者屬於主觀資料？①測量血壓為100/70mmHg ②尿液呈現清澈淡黃色澤 ③臉色蒼白、盜汗 ④感覺肚子痛、悶悶的。
199	鎮靜劑往往於麻醉前使用，主要的原因為何？①可舒緩病患緊張並增強麻醉效果 ②可以降低術後的疼痛 ③此類藥物具有直接的麻醉效果 ④可以讓病患於術後快速清醒。
200	精神分裂症病人在急性發病期或經過治療後，常尚存一些症狀，如思考流程障礙、奇怪的穿著及行為，以及明顯的表情平淡、生活懶散、缺乏動機等，這些敘述屬於下列何種症狀？①前驅症狀（prodromalsymptoms） ②解組症狀（disorganizing symptoms） ③負性症狀（negativesymptoms） ④殘餘症狀（residualsymptoms）。
201	疑似子宮頸癌病人表示擔心陰道內診檢查，下列回應何者適當？①「能告訴我您現在的想法嗎？」 ②「您不必害怕，每一個人都像您一樣，都會感到不舒服。」 ③「您不是擔心醫生的技術吧？您的醫生可是位專家呢！」 ④「我們保證會降低您的困窘。」。
202	有關換氣過度的敘述，下列何者正確？①常出現在腹水的病人 ②病人會有手指發麻及頭暈 ③主要是因為缺氧所致 ④病人會出現空氣飢餓感（airhunger）。
203	下列何者不是水溶性維生素？①維生素B6 ②維生素C ③維生素A ④葉酸（Folicacid）。
204	童先生因情緒高昂，要求出院未果，出現摔杯子與怒罵情形，正被帶入保護室隔離。此時護理人員如何處置較恰當？①向童先生解釋此處置原因 ②擬定暴力之行為契約 ③建立疾病的病識感 ④提醒再犯需加倍處罰。
205	有關嚴重腎絞痛的生理反應，下列何者錯誤？①疼痛輻射至陰囊 ②持續性悶痛 ③蒼白 ④盜汗。
206	下列何者為痔瘡切除術採用之姿勢？①膀胱截石術臥位 ②截刀式臥位 ③屈膝仰臥式 ④膝胸臥式。

207	青光眼患者應避免使用下列何種藥物？①Fexofenadine ②Cimetidine ③Loratadine ④Cyclizine。
208	王小姐剛得知被診斷為腸癌，情緒低落，無法入睡，食慾欠佳，此時護理人員最優先的處置是：①不必特別理會，但記錄她的進食情形 ②回應說：「看得出妳很擔心自己的病，可以跟我談談嗎？」 ③注意王小姐的人際互動情形 ④積極給予王小姐腸癌方面的衛教。
209	有關甲狀腺功能低下病人之護理措施，下列何者正確？①採集中護理，密切監測體溫過高和高血壓情況 ②鼓勵病人白天少活動，儘可能臥床休息，以免受傷 ③採少量多餐的高熱量、高蛋白及高脂肪飲食，以免體重減輕 ④病人服用甲狀腺製劑時，要觀察有無心絞痛、呼吸困難等症狀。
210	下列那些病人容易有口腔黏膜改變的問題，需給與特別口腔護理？A張口呼吸者B昏迷者C腹部手術者D化學治療者①ABC ②ABD ③ACD ④BCD。
211	下列那一愛滋病藥物之作用機轉為抑制反轉錄病毒的Reversetranscriptase？①Amantadine ②Oseltamivir ③Zidovudine ④Saquinavir。
212	照護邱太太的護理人員應如何處理？①適時隔開，引導邱太太表達 ②帶入保護室協助控制情緒 ③社交技巧的示範 ④教導壓力調適方式。
213	有關腎移植病人居家生活預防感染的措施，下列何者錯誤？①手術後3個月內避免日曬 ②保持規律排便習慣 ③避免接觸生病的親友 ④注意口腔衛生。
214	有關壓瘡之敘述，下列何者錯誤？①相同壓力，受壓面積愈大則局部壓力愈小 ②壓力大於25~30mmHg會造成局部組織的缺血 ③短時間承受大的壓力比長時間承受小的壓力傷害還大 ④肌肉組織對缺血的敏感度高於皮膚。
215	下列何者具有抗心律不整作用？①Phenytoin ②Phenobarbital ③Diazepam ④Ethosuximide。
216	邱太太在住院期間前2週，不斷要求出院，擔心被公司解僱與小孩缺乏照料，不斷打電話給家屬要求出院，下列何種處置最合宜？①禁止電話卡使用 ②同理感受與傾聽 ③請醫師出面會談 ④讓邱太太返家探視。
217	有關尿液收集的敘述，下列何者錯誤？①若是男病人，需請個案排尿時，將包皮向上拉起 ②尿液標本只能在清晨收集 ③收集12小時或24小時尿液時，需保存於冰箱中 ④尿液分析要取中段尿，以減少微生物污染。
218	下列何者不是長期臥床對心臟血管系統造成的影響？①姿位性低血壓 ②減少心臟負擔 ③形成靜脈血栓 ④增加伐耳沙伐氏操作（Valsalvamaneuver）機會。
219	下列那一種藥物最適合用於預防及治療變異性心絞痛（Variantangina）？①Atenolol ②Nicardipine ③Amylnitrite ④Metoprolol。



220	蔡先生神情焦躁，在病房來回踱步，護理人員此時的回應何者適當？①「蔡先生，我發現你一直來回走動，我看看能不能幫你？」 ②「蔡先生，你又情緒不穩啦？該學習控制情緒哦！」 ③「蔡先生，如果你不休息請到大廳，以免影響病友休息。」 ④「蔡先生，注意一下自己的情緒，不然無法出院。」。
221	收集痰液標本時，若病人無法順利咳出痰液，下列何者是最適當且簡易的輔助方式？①採高坐臥式，行有效咳嗽 ②給與氧氣 ③立即給與口鼻的抽吸 ④給與喉部的熱敷。
222	有關旋前（pronation）運動的敘述，下列何者正確？①轉前臂使掌心朝下 ②轉前臂使掌心朝上 ③腳掌面向身體中線 ④腳掌背離身體中線。
223	下列何者為第IV類抗心律不整藥物？①Verapamil ②Phenytoin ③Amirionone ④Propranolol。
224	王小姐一向冷靜、從容不迫，但參加工作面試時卻表現得非常焦慮，下列何項最適合描述王小姐的情況？①特質焦慮 ②情境焦慮 ③廣泛性焦慮 ④中度焦慮。
225	下列激素中，何者不是由腦下垂體前葉分泌？①生長激素 ②泌乳激素 ③促甲狀腺素 ④抗利尿激素。
226	當病人皮膚出現水泡，且受傷部位已到達真皮層，此時病人處於壓瘡的那一分期？①充血期 ②缺血期 ③壞死期 ④潰瘍期。
227	抗心律不整藥物中，Disopyramide是屬於那一類？①第I類 ②第II類 ③第III類 ④第IV類。
228	面對一位多疑、敏感、不易信賴人的個案，護理人員最適宜採取的治療性態度是：①放任自由 ②就事論事 ③被動友善 ④主動友善。
229	下列何者為酸化尿液的食物？①牛奶 ②蔓越莓汁 ③茶 ④橘子。
230	有關氧化乙烯（E.O.）滅菌法的敘述，下列何者錯誤？①E.O.的有效濃度為10~20% ②E.O.滅菌的溫度一般是50~60℃ ③濕度維持在40%以下為宜 ④滅菌時間依氧化乙烯之濃度、溫度、濕度改變的情況而定。
231	下列何者不是纖維蛋白溶解劑？①尿激酶（Urokinase） ②鏈球菌激酶（Streptokinase） ③Reteplase ④Eptifibatide。
232	有關團體治療的敘述，下列何者錯誤？①治療性團體是社會的縮影 ②腦傷的病人是團體治療成員的最佳選擇 ③團體治療可處理在治療過程中發生的移情作用 ④透過治療的有效因素，病人可獲得支持和情緒宣洩。
233	下列何者可以移除泌尿道結石？①泌尿道內視鏡檢查 ②尿路動力學檢查 ③膀胱超音波 ④尿道攝影術。

234	確立護理對象的現存健康問題是護理過程中的那一個步驟？①護理評估 ②護理診斷 ③護理措施 ④護理評估。
235	下列何者為國內合法之減肥藥？①Orlistat ②Amphetamine ③Tegaserod ④Haloperidol。
236	有關精神病人的權利，下列敘述何者錯誤？①精神病人有權拒絕會談時錄音、錄影 ②精神病人所有相關資料都應受保密 ③不得以精神疾患為理由受到任何歧視 ④精神病人有權留在精神科醫院接受長期的住院。
237	有關改良型乳房根除術的敘述，下列何者錯誤？①此手術將切除全部的乳房組織 ②此手術將清除腋下淋巴結 ③可保留大部分肩關節運動功能 ④術後患側肢體一定會發生嚴重的淋巴水腫。
238	有關預期成果的敘述，下列何者最完整？①病人能用柺杖走路 ②能促進傷口癒合 ③病人2天內能減輕疼痛程度 ④病人體重能於3週內減少1公斤。
239	下列那一種藥物可治療腎上腺皮質機能不足及艾迪生氏症（Addison's disease）？①Fludrocortisone ②Betamethasone ③Triamcinolone ④Fluorometholone。
240	有關老年精神病人的護理原則，下列敘述何者正確？A協助其回到職場B鼓勵參與同輩的團體活動C增加環境的多變性D維持其日常活動功能有最高獨立程度①AB ②AC ③BD ④CD。
241	「只要打噴嚏，褲底就濕濕的」，此現象為下列何種尿失禁？①壓力性尿失禁 ②急迫性尿失禁 ③溢出性尿失禁 ④心理性尿失禁。
242	有關潛在性危險性的護理診斷，下列敘述何者正確？①出現症狀與徵象 ②具定義性特徵 ③訂定目標及措施，預防健康問題發生 ④護理措施之重點在減輕症狀。
243	下列何種抗癌藥物屬於單株抗體？①Topotecan ②Tamoxifen ③Trastuzumab ④Ifosfamide。
244	病房中播放輕音樂可協助失智症病人，其主要功能為何？①喚起其正向記憶 ②提供放鬆的環境 ③改善其記憶力 ④創造熟悉的環境。
245	有關愛迪生危機的特徵，下列何者正確？①高血鉀 ②高血壓 ③高血糖 ④體溫持續過高。
246	「每2小時協助病人翻身1次」是屬於下列何種護理功能？①獨立性護理功能 ②相依性護理功能 ③非獨立性護理功能 ④醫囑性護理功能。
247	下列何者是磺胺類藥物最常見的副作用？①尿道結石 ②心律不整 ③掉髮 ④視力模糊。

248	有關輕度智能不足的敘述，下列何者正確？①依據DSM-IV，智商為35~40 ②感覺運動方面有嚴重障礙 ③入學前通常無法發展社交及溝通技能 ④成年期通常可達到具有職業技能的程度。
249	下列那一項不是類風濕性關節炎之診斷標準？①發生對稱性的關節腫脹 ②關節X光顯示關節間隙變窄 ③連續1星期的早晨出現關節僵硬的情形 ④切片顯示滑膜細胞與絨毛組織增生。
250	當病人出現數個健康問題，下列何者在安排護理診斷的優先順序上需作考量？①護理措施的方便性 ②大多數病人的共同問題 ③人力的安排 ④病人覺得健康問題的重要性。
251	鉛中毒的最佳解毒劑是：①Deferoxamine ②EDTA ③Pralidoxime (PAM) ④Penicillamine。
252	有關自閉症之敘述，下列何者錯誤？①罹患此障礙者男孩多於女孩 ②病童的言語溝通發展正常 ③此障礙與兒童期精神分裂症不同 ④病童行為及活動模式受到局限。
253	急性腎衰竭少尿期病人的臨床表徵，下列何者正確？A高血鉀B低血磷C代謝性鹼中毒D低血鈉①AB ②AD ③BC ④CD。
254	有關使用無菌包的敘述，下列何者正確？①解開無菌包後，有帶子的一角應置於操作者的近側 ②打開包布時只要不碰到內裝的敷料就好，包布的內面可以碰觸 ③取出所需敷料後應儘快將包布內角覆蓋剩餘敷料，以減少暴露時間 ④無菌敷料包中剩下的敷料，即使仍在有效期限內也不可再使用。
255	光線通過下列何種眼球構造時，不會產生折射作用？①瞳孔 ②水晶體 ③角膜 ④房水。
256	夏小姐對嗎啡出現耐受性，在使用安非他命時需大劑量才能滿足之現象稱為：①心理依賴 ②身體依賴 ③相互耐受性 ④戒斷症狀。
257	有關燒傷病人的護理指導，下列何者錯誤？①水療可幫助軟化焦痂 ②水療時，室溫宜維持26.6~29.4℃ ③鼓勵在水療池運動肢體 ④水療時間愈長，復健效果愈佳。
258	有關護理目標書寫時的注意事項，下列敘述何者錯誤？①目標書寫時應簡潔且扼要 ②書寫時是以護理人員將達到的事項為目標 ③具體目標應使用可測量或可觀察到的文字來敘述 ④護理目標是執行護理措施之後做為評估時的依據。
259	下列何者是萊姆病 (Lyme disease) 的致病原？①創傷弧菌 (Vibriovulnificus) ②包氏螺旋體 (Borrelia burgdorferi) ③乳酸桿菌 (Lactobacillus) ④雙鉤端螺旋體 (Leptospira biflexa)。
260	個人在社區中與他人交往及參與社會團體的過程，滿足歸屬感及自我實現的需要，並做為人與人溝通的管道，係指華倫 (Warren, 1972) 所稱的那一種社區功能？①相互支援的功能 ②社會控制的功能 ③社會參與的功能 ④社會平權的功能。

261	有關止血帶止血法的敘述，下列何者正確？①適用於四肢大出血 ②止血帶是大出血的首選止血法 ③止血帶最好綁在出血傷口上，效果佳 ④止血帶止血應每隔30~40分鐘放鬆30秒。
262	使用甘油做潤唇液的濃度應為下列何者？①100% ②80% ③50% ④20%。
263	下列何細菌會引起食物中毒，並導致神經麻痺和呼吸心跳停止？①炭疽桿菌（ <i>Bacillus anthracis</i> ） ②破傷風桿菌（ <i>Clostridium tetani</i> ） ③肉毒桿菌（ <i>Clostridium botulinum</i> ） ④葡萄球菌（ <i>Staphylococcus</i> ）。
264	社區健康評估時，社區護理人員收集並了解社區的歷史沿革，其目的為何？①作為決定社區服務地點的主要依據 ②較能擬定符合民眾價值觀的健康計畫 ③讓民眾了解社區護理人員走入社區的誠意 ④拉攏民眾對社區的共識，建立共同的信仰。
265	有關原發性醛固酮過多症之臨床表徵，下列何者正確？①低血鈉 ②低血鉀 ③低血容積 ④代謝性酸中毒。
266	當病人告訴你他有神力可以飛行，你為其主護護理人員，下列何種反應最適當？①「怎麼可能，我不相信。」 ②「這真的令我難以相信！」 ③心不在焉地點頭或「嗯」 ④「我相信，那您可以飛給我看嗎？」。
267	細菌感染後引起的急性腎絲球腎炎、風濕熱，多半是下列何者所引起的？①A群鏈球菌 ②肺炎鏈球菌 ③金黃色葡萄球菌 ④白色念珠菌。
268	三段五級預防中，何者適用於疾病自然史中的易感期？①健康促進 ②早期診斷 ③限制殘障 ④復健。
269	有關注射penicillin引發蕁麻疹之敘述，下列何者正確？①屬於細胞毒性過敏反應 ②其過敏反應物質和濕疹性及接觸性皮膚炎相同 ③會出現亞都司氏反應（ <i>Arthus reaction</i> ） ④屬於IgE所引發之過敏反應。
270	下列何者不是觀察病人之目的？①作為擬訂護理計畫的依據 ②作為幫病人下決定的依據 ③作為醫療小組診斷治療之參考 ④作為未來護理研究與發展的參考。
271	下列那一種寄生蟲可經由胎盤感染胎兒造成先天性感染？①痢疾阿米巴（ <i>Entamoeba histolytica</i> ） ②梨形鞭毛蟲（ <i>Giardia lamblia</i> ） ③剛地弓形蟲（ <i>Toxoplasma gondii</i> ） ④大腸纖毛蟲（ <i>Balantidium coli</i> ）。
272	與社區居民共同進行社區健康評估及社區衛生活動，最終的目標是：①完成社區評估成果之書面報告 ②和社區居民建立良好的人際互動關係 ③使社區居民有能力解決自己的健康問題 ④運用社區內部的資源推展社區服務工作。
273	使用帕克蘭公式（Parkland formula）計算燒傷病人的輸液補充量，下列敘述何者正確？A使用乳酸林格氏液來做急救(B)燒傷後第2個8小時給輸液總量的1/4(C)燒傷後第1個24小時給與葡萄糖水2000mL(D)燒傷後第1個24小時需給與膠體(E)輸液計算公式為4c.c. ?kg（體重）?%BSA①ABE ②ACD ③ACE ④BCD。

274		下列何者為醫院最常見的機械性傷害？①燒燙傷 ②觸電 ③跌倒 ④火災。
275		下列何者是革蘭氏陰性桿菌？①白喉棒狀桿菌（ <i>Corynebacterium diphtheria</i> ） ②大腸桿菌（ <i>Escherichia coli</i> ） ③炭疽桿菌（ <i>Bacillus anthracis</i> ） ④肉毒桿菌（ <i>Clostridium botulinum</i> ）。
276		有關空氣中「光化學霧（photochemical smog）」，是因何種污染物經光化學反應所產生微粒狀物質，而懸浮於空氣中，造成視覺障礙？①氟化合物與氯氧化合物 ②氮氧化合物與碳氫化合物 ③硫化合物與氯化合物 ④氟化氫與氯乙烯。
277		有關肺葉切除術後之護理措施，下列何者錯誤？①抬高床頭30~40度，促進通氣 ②鼓勵採用腹式呼吸，預防肺擴張不全 ③側臥向患側，促進胸腔引流 ④協助執行肩部運動，預防關節黏滯。
278		有關鋪床之注意事項，下列何者正確？①應遵守外科無菌原則 ②橡皮中單上應再加鋪布中單 ③應使用肩部力量，而非手肘小肌肉力量 ④鋪床後應將床鋪搖高固定。
279		下列何種疾患不致產生延遲過敏反應及肉芽腫現象？①念珠菌菌血症 ②結核病 ③癩瘋症 ④類肉瘤症。
280		個案為獨子，父母雙亡，2子由分居3年的妻子扶養，現與外國籍的女友同居並育有1女。下列何者為個案家系圖（genogram）的慣用畫法？圖一圖二圖三圖四SS ①圖一 ②圖二 ③圖三 ④圖四。
281		有關鼻出血的處置，下列何者錯誤？①平躺且床頭抬高 ②坐下且頭部往後仰 ③冷敷鼻部及額頭 ④坐著且臉部朝下。
282		給與病人背部按摩時，下列何者為開始與結束所使用之方法？①按撫法（stroking） ②揉捏法（kneading） ③重擦法（friction） ④敲擊法（tapotement）。
283		下列何者是厭氧菌無法在有氧的環境下生長的原因？①氧氣會抑制菌體內酵素的活性 ②氧氣會導致DNA氧化而無法進行複製 ③無法移除有自由基（freeradicals）的氧代謝物 ④氧氣會抑制其細胞壁的合成。
284		對於國小學童施以800公尺跑走測驗，是要測量其那一方面之體適能？①肌肉適能 ②心肺適能 ③柔軟度 ④身體組成。
285		下列何者是造成院內感染肺炎最常見的革蘭氏陰性菌？①綠膿桿菌 ②金黃色葡萄球菌 ③肺炎鏈球菌 ④嗜血性感冒桿菌。
286		協助病人使用烤燈的步驟，下列何者正確？①照射前、後在局部皮膚塗上一層油劑 ②烤燈至皮膚的距離為：40瓦特數，25~30吋 ③烤燈使用時間以15~20分鐘為限 ④皮膚出現過度發紅、疼痛時，將距離拉遠。

287	有關細菌發酵 (fermentation) 的敘述，下列何者錯誤？①它是一種產生能量的反應 ②發酵反應可作為鑑別細菌的依據 ③發酵反應只能在有氧的環境中進行 ④通常產生酸和二氧化碳。
288	鼓勵新移民加入識字班，主要目的為何？①提升溝通能力 ②使主流社會多了解新移民 ③提升教育程度 ④增加就業率。
289	施救者發現溺水獲救者，其呼吸停止但仍有心跳，下列處置何者正確？①開始進行人工呼吸及心外按摩 ②作人工呼吸直到溺水者能自行呼吸 ③進行哈姆立克急救法，將水壓擠出來 ④不斷搖動溺水者，刺激其自行呼吸。
290	下列何者是護理人員回應王先生最適當的方式？①「你不要灰心，我們一定會盡全力讓你康復的。」 ②「你怎麼可以講這種喪氣的話。」 ③「你想不想跟我談一談？」 ④「想一想你的家人，你死了他們怎麼辦？」。
291	砂眼披衣菌 (Chlamydia trachomatis) 生活史中，存在細胞內具傳染能力之型態為何？①囊體 (Cyst body) ②原質小體 (Elementary body) ③網狀小體 (Reticulate body) ④滋養體 (Trophozoite body)。
292	王小姐剛上任為某衛生所公衛護理人員，認識到慢性病是社區中重要的健康問題。王小姐執行慢性病防治工作中，最優先的事項為：①飲食衛生教育 ②篩檢活動以便早期發現個案 ③爭取就醫經費補助 ④提供復健服務。
293	心臟移植後出現急性排斥反應之臨床處置，下列何者正確？①立即手術取出植入的心臟 ②併用 cyclosporin A，以抑制 IL-3 作用 ③使用類固醇，以增加抗體的形成 ④使用 FK506 (tacrolimus)，以抑制 T 細胞生長因子的產生。
294	王先生主訴：「我全身好痛，快給我打止痛針。」則護理人員應該採取下列何種護理措施？①相信他所說的，依醫囑給與止痛劑 ②轉移他的注意力以減輕疼痛 ③懷疑他所說的，然後給與安慰劑 ④跟他解釋用止痛劑會造成成癮現象，所以請他忍耐。
295	下列何者並非抗原呈現細胞？①交指樹突狀細胞 ②B 淋巴細胞 ③紅血球細胞 ④血管內皮細胞。
296	護理人員為了達到健康促進目的，下列何種策略於短時間內改變個人層次的生活方式最具成效？①上對下的直接指導方式 ②與個案一起做，將個案的健康視為護理人員的責任 ③透過法令宣導及強制取締危害健康行為 ④進行一對一的衛生教育課程。
297	發生代償性休克時，身體會有下列那些變化？①血壓上升或趨於正常 ②心輸出量下降 ③呼吸加快 ④心跳減慢 ① ①② ② ①③ ③ ②④ ④ ③④。
298	王先生因病情加劇不幸去世，家屬難忍悲痛痛哭失聲。護理人員應採取的措施，下列何者最適當？A 將家屬帶到會客室 B 傾聽家屬之陳述，並陪伴家屬 C 請家屬先離開，以免影響其他病人 D 待家屬情緒較穩定時，引領家屬一同做屍體護理，送王先生最後一程 ①ABC ②ABD ③ACD ④BCD。

299	下列何者是測試幽門螺旋桿菌（ <i>Helicobacter pylori</i> ）最快捷的方法？①尿素酶測試（Ureasetest） ②氧化酶測試（Oxidasetest） ③觸酶測試（Catalasetest） ④黏附素測試（Adhesintest）。
300	村裡的老人關節痛會拔某草藥來服用，且說效果很好，無副作用，公衛護理人員較合適的做法是：①請他去看醫生 ②詢問及評估服用草藥的反應 ③給予關節炎的衛教 ④請他立即停止服用草藥。
301	有關病人執行支氣管鏡檢查前後的護理措施，下列何者正確？①檢查前1小時，給與 $\beta 2$ 支氣管擴張劑，可促進氣管擴張 ②檢查中，醫師注射2% <i>Xylocaine</i> ，可避免聲帶移動 ③檢查後，需待嘔吐反射恢復之後，病人才可以進食 ④檢查後，若痰中出現血絲，應立即告知醫師，請其開立止血劑。
302	有關硫酸鋇（ <i>bariumsulfate</i> ）灌腸的敘述，下列何者正確？A屬於非保留灌腸中的診斷性灌腸B灌入量500~1500c. c. C檢查前須先做清潔灌腸D硫酸鋇會被腸黏膜吸收，無副作用E檢查前一天應進食低渣飲食，9P. M. 後即禁食①AC ②AD ③BC ④CE。
303	下列何種分子具有多重變異性，可與不同之抗原分子結合？①T細胞表面之CD4 ②血小板表面之GpIIb/IIIa ③B細胞產生之抗體 ④趨化分子之白三烯素（LTB <sub>4</sub> ）。
304	有關世代研究法的敘述，下列何者正確？①在研究過程中，可提供觀察疾病自然史的機會 ②與病例對照法相較，其所需的樣本數較少 ③適合用於潛伏期長的疾病之探討 ④獲得個案的疾病狀況後再加以分類。
305	有關黴菌引起的皮膚傳染病，下列何者是由家中寵物傳染而來？①髮癬 ②體癬 ③股癬 ④足癬。
306	有關輻射散熱的敘述，下列何者錯誤？①人在室溫的休息狀態中，大約有50~70%的熱是以輻射方式散失的 ②其傳播是不需以其他物質作媒介的 ③其熱源的散失是直接的，可把熱輻射至四面八方 ④在溫度較高的環境中，輻射散熱的比例也較高。
307	下列何者為抗黴菌藥物？①萬古黴素（ <i>Vancomycin</i> ） ②青黴素（ <i>Penicillin</i> ） ③紅黴素（ <i>Erythromycin</i> ） ④多烯烴類（ <i>Polyene</i> ）： <i>Amphotericin B</i> 。
308	粗出生率減去粗死亡率是：①社會增加率 ②自然增加率 ③生命指數 ④人口密度。
309	有關右肺張力性氣胸護理評估之敘述，下列何者正確？①右胸燒灼性鈍痛 ②右肺之擴張度大於左肺 ③叩診右邊胸部，會出現過度反響音 ④聽診右邊胸部，會出現喘鳴音。
310	有關坐臥姿之敘述，下列何者錯誤？①可減少頸部術後的出血 ②需用枕頭支托頸、背部，以維持脊椎正常曲線 ③不可搖高床尾，以防壓迫膝關節神經 ④勿快速更換姿勢，以防姿位性低血壓。

311	下列那一種病毒可透過胎盤感染胎兒，造成肝脾腫大、神經受損，甚至可導致嬰兒死亡？①水痘-帶狀疱疹病毒（Varicella-zostervirus） ②EB病毒（Epstein-Barrvirus） ③巨細胞病毒（Cytomegalovirus） ④單純疱疹病毒（Herpes simplexvirus）。
312	傳染病的各種防治措施，可以透過下列何種途徑讓民眾自動的採取預防性的行為？①衛生教育 ②預防接種 ③隔離 ④檢疫。
313	一位產婦向護理人員詢問有關玻璃奶瓶的煮沸消毒方法，下列敘述何者錯誤？①消毒前，應先將奶瓶洗淨 ②奶瓶應於水煮沸後，再放入 ③煮沸時，水面應蓋過奶瓶1吋以上 ④消毒時間以水沸騰後，開始計時10分鐘。
314	細菌抗藥性的產生除了自體突變之外，經常是由其他細菌轉移得到，下列那一種作用過程是最常見的機轉？①接合作用Conjugation） ②形質導入（Transduction） ③形質轉換（Transformation） ④分泌作用（Secretion）。
315	社區護理人員對傳染病的最根本預防之道在於：①進行高危險群的篩檢 ②設置遊民收容中心 ③加強衛生教育宣傳 ④有效控制境外移入病例，凡發現帶有陽性傳染病者應即遣送返國。
316	有關類風濕性關節炎之敘述，下列何者正確？①男性發病率為女性之3倍 ②紅血球沉降速率（ESR）於疾病活動期升高 ③約75%病人血清中可查出IgA類風濕因子 ④關節受侵犯通常呈多發性、非對稱性之型態__。
317	為了增加憂鬱病人興奮刺激作用，應佈置下列何種色系的環境？①粉紅色 ②米黃色 ③水藍色 ④墨綠色。
318	關於可能造成狂牛症的感染性蛋白（prion）之敘述，下列何者錯誤？①感染後，潛伏期長 ②對熱安定，不易破壞 ③能引起發炎反應 ④其對放射線的抵抗相對強而不易去活化。
319	性比（sexratio）的計算式中之分母是：①年中人口之女子總數 ②年中人口之男子總數 ③年中人口之總數 ④15~64歲之人口總數。
320	有關收集尿液培養檢體的敘述，下列何者正確？①主要目的之一是檢查尿液是否有病毒感染 ②尿液檢體最好在60分鐘內送檢 ③尿液檢體放置過久，會造成尿液pH值升高 ④若病人有存留導尿管，則將導尿管與蓄尿袋分離，再以空針從導尿管開口處抽取尿液檢體。
321	倪女士，29 歲，程式工程師，輕躁症發作（hypomanic episode）。「我都有按照醫生的交代認真吃藥，為什麼還會發病？」護理師說：「你覺得很挫折，覺得自己很認真的吃藥卻還是發病」，此時護理師所運用的溝通技巧，下列何者最適當？ ①反映 ②鼓勵比較 ③面質 ④提出懷疑。



322	精神復健機構的資深護理師協助病人接受「強制社區治療」的工作項目中，下列何者正確？A藥物治療 B藥物之依賴性評估 C藥物之血液檢驗 D藥物之尿液濃度檢驗 E酒精篩檢 F放射性藥物檢驗 ①ABCD ②BCDE ③ACDE ④ACDF。
323	身為專業的精神衛生護理人員，對精神科病人應有的認識，下列敘述何者正確？A①病人怪異的想法和行為，都是有目的、有意義的，且為滿足某個需要或溝通某種訊息而呈現出來 ②精神病人的導因，並非來自單一的病因，而是基因、生活、心理、社會，相互影響的結果 ③精神病人多半缺乏自信，無安全感、挫折忍受度或抗壓性低 ④一旦診斷為重度精神疾患，就難以治癒，故不需太多關注於病人的病態思想、情緒和行為，只需維持病人的基本生理照護即可 ①①②③ ②①②④ ③①③④ ④②③④。
324	精神科醫師伯恩（Eric Berne）在溝通分析中，將人與人互動時彼此的人生地位分為四種型式。下列何者敘述屬於「我好—你不好型」？①覺得自己、他人，甚至全世界都毫無意義 ②相信自己與他人，能積極面對自己與他人 ③覺得自己沒有價值，常歸咎自己，認為人生不快樂 ④不相信別人、自大，易以憤怒的狀態去面對別人。
325	俗稱安公子的安非他命，其戒斷症狀最可能為下列何者？①精力旺盛 ②全身耗竭虛脫、憂鬱沮喪 ③肌肉僵直 ④注意力集中。
326	有關抗精神病藥物的副作用，下列敘述何者最適當？①可能引起血壓下降，病人臥姿改為立姿動作應緩慢及注意安全 ②靜坐不能副作用主要發生在服用抗精神病藥物達兩年以上的病人 ③服用第一代抗精神病藥物較第二代抗精神病藥物容易發生代謝症候群 ④若發生類巴金森氏症的錐體外徑症候群副作用，應立即停藥觀察。
327	有關 Benzodiazepine(BZD)類藥物，下列注意事項敘述何者最適當？①為海洛因成癮替代療法之主要用藥 ②可減緩病人因酒精戒斷產生的不適 ③短效型藥物的半衰期為 12 小時以上才能達助眠效果 ④長期使用 BZD 不會發生耐受性、成癮性和戒斷症狀。
328	羅小姐，30 歲，診斷為雙相情緒障礙症，居家護理師至其家中訪視，發現可能是躁症發作。下列何者為其最可能出現的症狀？①淡漠、病識感差、思考貧乏 ②焦慮、身體症狀、睡眠中斷 ③高昂、活動量大、判斷力差 ④社交隔離、妄想、音韻連結。
329	有關病人服用精神科相關藥物的反應及處置，下列何者最適當？①病人開始服用 Venlafaxine (Efexor®) 若抱怨有噁心感 (nausea)，應建議立即停藥或換藥 ②觀察到剛服用 Mirtazapine (Remeron®) 的病人有鎮靜 (sedation) 表現，應建議立即停藥或換藥 ③服用選擇性血清素再吸收抑制劑 (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, SSRI) 的病人，可衛教其自我限制熱量攝取，因為其體重隨時會增加 ④觀察到服用 Haloperidol (Haldol®) 的病人有遲發性不自主運動 (tardive dyskinesia) 的表現，應建議立即停藥或換藥。
330	有關思覺失調症病因的敘述，下列何者最適當？①發生率為 5%左右 ②好發年齡是中老年期 ③發病與神經心理因素無關 ④男女發生率相當。
331	某次張小姐在團體治療過程中說：「尤先生剛才指出我在團體中講話的態度引起別人的不舒服，使我更了解到自己和別人互動的問題。」這段話在團體治療中有關對治療性因素的敘述，下列何者最適當？①利他因素 ②人際學習 ③模仿行為 ④普遍性。

332		下列何者屬於心理分析治療的策略？ ①抗拒的解析 ②正向增強 ③人際溝通訓練 ④認知再建構。
333		根據門寧格（William Menninger）所提出的態度治療理論，對於有操控、挑撥、過分要求的病人，最適當的治療態度為何？ ①主動友善 ②被動友善 ③就事論事 ④寬容。
334		有關下列疾患的心理因素，下列何者正確？ ①人際關係學派提及強迫症的發作源自於早年的肛門期，個人常以自我防衛機轉處理焦慮 ②以精神分析的觀點來分析焦慮之導因，主要認為焦慮與同儕缺乏同理心有關 ③學習理論之行為學派視焦慮為一種刺激、反應連結的學習反應 ④認知學派認為趨避衝突最會誘發個人的焦慮。
335		關於認知行為治療技巧的敘述，下列何者最適當？ ①僅需要寫下能夠支持負向想法的證據 ②用會引起焦慮或災難化的解釋 ③分析早期發展對問題的影響 ④利用觀察現實，排除自我中心。
336		張太太，58 歲，診斷為憂鬱症，入院第三天，整天躺床，覺得焦慮不安、精神不集中且常常哭泣，對病房活動沒有參與動機，下列何者照護措施較適當？ ①安排在走廊最後一間的房間，以避免過多人走動而干擾病人的休息 ②選擇競爭性活動以增進病人的生存動機 ③接受病人宣洩抑鬱情緒的表達方式 ④安排白天參與需要耗費體力的活動。
337		楊小姐，52 歲，診斷為憂鬱症，向護理師抱怨：「請你告訴醫生吃藥讓我非常不舒服。」護理師的回答，下列何者最適當？ ①醫生是為了妳好，請妳多忍耐 ②醫生查房時，請妳直接跟醫生說 ③請再多描述是怎麼樣的不舒服 ④樂觀一點，妳很快就會好起來。
338		小菲，18 歲，診斷為思覺失調症。小菲雖有規則服藥，但是幻聽干擾時好時壞。父母打聽可以做電氣痙攣療法，因此詢問護理師的意見，下列何者回答最適當？ ①告知須完全聽從醫師的指示 ②指出電氣痙攣療法的效果不好 ③說明病人年紀太小不適合 ④詢問父母對電氣痙攣療法的期望。
339		王小姐，與男朋友分手後，出現被跟蹤的感覺，身邊沒有人時卻聽到有人跟她說話，害怕到無法外出工作，且上述症狀持續 1 個月以上。依據 DSM-5 診斷準則，下列何者是王小姐最可能的診斷？ ①重度憂鬱症（major depressive disorder） ②創傷後壓力症（posttraumatic stress disorder） ③思覺失調症（schizophrenia） ④強迫症（obsessive-compulsive disorder）。
340		林小姐，15 歲，診斷為思覺失調症，多次因和母親的男朋友有爭執，出現幻聽。下列何者居家護理措施最適當？ ①教導病人接受母親的男友 ②建議病人獨居減輕衝突 ③安排強制住院 ④安排家庭治療。

341	葛先生，診斷為雙相情緒障礙症，入院第三天，在入院期間常常在大廳走動，很容易與其他病友起口角或衝突，經醫療團隊討論後決定給予葛先生執行隔離措施，對隔離措施的敘述，下列何者正確？ ①減少感覺輸入，減少外界過多的刺激 ②是一種行為治療法，藉以約束葛先生的行為，以減少與他人之衝突 ③隔離措施沒有程度上的差別 ④是一種控制手段，以維護病房的安寧。
342	有關創傷後壓力症（posttraumatic stress disorder）的敘述，下列何者錯誤？ ①對災難事件不斷反覆的經驗再現（flashback） ②持續逃避與此創傷有關的刺激 ③症狀持續超過 1 個月 ④常使用抵消的防衛機轉。
343	強迫症（obsessive-compulsive disorder）的主要臨床症狀，下列敘述何者正確？ ① 10 分鐘內達到極重度之焦慮表現，如呼吸困難 ②刻意逃避社交場所 ③有特定對象引發焦慮，如針筒 ④出現難以控制的重複性行為及思想。
344	下列有關急性壓力症（acute stress disorder）的敘述，何者錯誤？ ①創傷後次日可確定診斷 ②暴露於真正或具威脅性的死亡、或重傷 ③會出現逃避、解離、警覺等症狀 ④會引起社交、職業等功能減損。
345	有關焦慮的敘述，下列何者最適當？ ①焦慮是主觀的感受，皆與情境無關 ②中度焦慮時注意力集中，利於學習效果 ③焦慮伴隨的身體症狀，主要以自主神經系統反應為主 ④防衛機轉不能降低焦慮。
346	張先生為長期飲酒，反覆住院戒酒之病人，此次入院後第二天，心跳過快、血壓升高、大量流汗，聲稱於病室內看到蛇。此時病人最可能出現的是下列何者？ ①酒精性失憶 ②躁症發作 ③癲癇發作 ④震顫性譫妄（delirium tremens）。
347	物質使用障礙症病人，會產生心理依賴（psychological dependence），下列敘述何者正確？ ①使用物質過量或過久而持續想要戒除，因此花時間尋找使用之物質以及對物質的渴求 ②強烈對物質的渴求，為避免不愉快的感受，而持續或間歇式的使用該物質 ③使用物質造成身體傷害，明知使用物質對身體有傷害仍持續使用 ④因物質使用嚴重，而產生了依賴性，一旦停止使用，會導致身體不適情形。
348	有關物質使用障礙症個案的追蹤輔導的敘述，下列何者錯誤？ ①降低個案渴求物質與預防再發 ②建立健康與調適的生活型態 ③主要採取住院方式實施輔導 ④定期諮商以及協助個案參加治療。
349	有關厭食症（anorexia nervosa）的臨床特徵敘述，下列何者最不適當？ ①好發於年輕女性 ②強烈害怕體重增加或變胖 ③臨床上常見合併思覺失調症 ④限制攝取身體所需能量。
350	有關與神經障礙症兒童溝通，下列何者最不適當？ ①簡短具體的結構性語句 ②初次評估必須運用身體接觸技巧 ③避免太抽象的語句 ④強調正向的回饋。
351	針對譫妄病人的護理措施，下列何者正確？ ①限制飲水，以減少尿失禁情形 ②環境布置多元豐富，以增加感官刺激 ③出現睡眠紊亂時，應優先給予安眠藥物幫助入睡 ④溝通時應簡短扼要，重複告知人事時地物的訊息。

352	有關老年精神病人的藥物治療，下列敘述何者最適當？ ①第二代抗精神病藥物較第一代藥物不會引發老年人的錐體外徑症候群 ②使用三環抗憂鬱劑治療老人憂鬱症，較不會出現心血管方面的副作用 ③情緒穩定劑有嚴重的副作用，不建議老年躁症病人使用 ④老年病人使用抗精神病藥物，應從高劑量開始，以增加藥物療效。
353	慢性思覺失調症病人，於急性病房出院後，轉介至社區復健中心接受工作技能訓練。以三級預防概念 來看，「社區復健中心」是屬於何種層級的預防性服務範疇？ ①初級預防 ②次級預防 ③三級預防 ④危機處置。
354	有關社區心理衛生的敘述，下列何者最適當？ ①社區心理衛生的工作完全仰賴社區健康服務中心執行 ②醫院與社區的銜接是社區心理衛生工作不可或缺的一環 ③社區心理衛生乃以社區沒有精神疾病為目標 ④社區心理衛生乃以生物醫學治療模式為主要介入模式。
355	根據 DSM-5 診斷準則，智能不足嚴重度的分類，下列何者最不適當？ ①依據智力測驗分數區分 ②依據適應功能做區分 ③嚴重度分為輕、中、重以及極重度 ④智力與適應功能缺損在發展期間發生。
356	下列何者屬於社區心理衛生工作的初級預防？ ①轉介精神病人至社區復健機構 ②提供社區民眾心理衛生教育 ③提供康復期精神病人職能訓練 ④提高慢性精神病人服藥順從度。
357	在精神護理之家的護理人員以住民為中心，提供連續性、持續性的照顧，於其角色功能，下列何者正 確？①醫療疾病診斷者 ②聯繫者 ③策畫者 ④協調者 ⑤個案管理者 ①僅①②③ ②僅②③④ ③①③④⑤ ④②③④⑤。
358	陳女士，診斷為思覺失調症，因擅自停藥致病情復發，已入院治療一個月，預計下週辦理出院，有關 出院準備的護理措施，下列何者最適當？ ①要求家屬完全負起監督病人服藥的責任 ②安排病人接受職業訓練，出院後謀生 ③教導家屬凡事皆予代勞，以預防病人再度發病 ④引導病人與家屬了解精神疾病規則服藥的重要性。
359	護理人員與精神病人會談時，常用的治療技巧，下列何者正確？①全神貫注地傾聽 ②儘量不要使用「為什麼」的問句 ③運用面質技巧盡速建立護病關係 ④運用澄清的技巧了解病人的想法 ①①②③ ②①②④ ③①③④ ④②③④。
360	有關慢性精神病人四段七級健康促進模式的主要策略，下列何者正確？ ①第一級策略為健康促進、急性精神症狀控制 ②第三級策略為居家護理、社區小作手方案 ③第五級策略為健康檢查、吸菸嚼檳榔等高風險族群篩檢 ④第六級策略為轉介居家治療與精神長照機構。
361	有關依賴指數（dependency ratio）的敘述，下列何者錯誤？ ①又稱扶養比 ②是指 65 歲以上老年人口占生產力人口的比例 ③數值越高表示生產力人口的負擔愈重 ④生產力人口是指 15~64 歲人口。

362	依據傳染病致病三角模式，若要提升宿主的抵抗力，下列敘述何者最適當？①離開醫院要洗手 ②注射疫苗 ③攝取均衡飲食 ④保持規律運動 ⑤手部噴酒精 ①②③ ②①②⑤ ③②③④ ④③④⑤。
363	有關長期照顧十年計畫 2.0，A、B、C 級服務單位的敘述，下列何者最不適當？① A 級單位為失能者擬定照顧服務計畫及連結或提供長照服務 ② B 級單位為複合型服務中心，擴充提供照護服務 ③ C 級單位可提供社區第一線的長期照顧服務 ④為提供可近性服務，應普設 A 級單位。
364	有關鉛中毒的敘述，下列何者最不適當？①孩童比成人更容易鉛中毒 ②建議水龍頭應選用不鏽鋼材質 ③煮沸法可去除水中的鉛 ④鉛可能導致嬰幼兒的學習能力障礙。
365	全民健康保險大幅減低就醫者的經濟負擔，造成民眾因而可能隨意使用過多的醫療服務，此現象為下列何種危害？①經濟危害（economic hazard）②道德危害（moral hazard）③社會危害（social hazard）④制度危害（system hazard）。
366	有關出院準備服務的敘述，下列何者最不適當？①強調跨專業團隊合作 ②一入院 24 小時內開始進行 ③協助照護資源之轉介或利用 ④個案出院當日即結案。
367	某社區共有 5,700 位居民運用某子宮頸癌篩檢工具，發現原本 2,500 名子宮頸癌的個案經篩檢後有 500 名呈現陽性，2,000 名呈現陰性；而原本 3,200 健康者經篩檢後有 1,600 名呈現陽性，另 1,600 名呈現陰性結果，此篩檢工具的陽性預測值為何？① 20% ② 23.81% ③ 44.44% ④ 50%。
368	下列何項生命統計指標可做為評估國家、社會、經濟和衛生等政策規劃的綜合指標？①社會增加率 ②人口成長率 ③原因別死亡率 ④育齡婦女總生育率。
369	根據資料顯示，出血型登革熱的病例中有 15~50%會死亡。15~50%代表的意義為何？①死亡率 ②致死率 ③原因別死亡率 ④死亡相對危險性。
370	根據三段五級疾病預防概念，下列何者屬於特殊保護的層級？①婚前健康檢查 ②均衡飲食 ③職場使用護具 ④疫苗接種 ⑤性教育 ①①② ②②③ ③③④ ④④⑤。
371	以走街式調查法進行社區健康評估，較不適合用來收集下列那一個系統的資料？①娛樂系統 ②安全運輸系統 ③人口與生命統計 ④健康及社會服務。
372	某社區糖尿病盛行率高但運動風氣不佳，社區護理師邀請奧運國手拍攝規律運動的宣導短片，引發社區動力。這是使用下列那一種方法？①攀龍附貴法 ②競賽法 ③自我導向學習法 ④社會行銷。
373	有關評估社區民眾需求與互動方式的資料，下列何者較不適當？①實地考察 ②參與式觀察 ③德菲（Delphi）法 ④重要人物訪談。
374	進行社區評估資料收集時，下列資料，何者無法從各鄉鎮區公所的戶政系統取得？①遷入遷出人數 ②出生死亡人數 ③外籍人口數 ④身心障礙人數。

375	護理師進行社區評估，運用政府或相關機構的統計資料，是屬於何種評估方法？ ①參與式觀察法 ②文獻考察法 ③擋風玻璃式調查法 ④社會調查法。
376	政府為提升嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫苗接種率，透過里幹事協助老人預約鄰近的診所，並發通知單提醒接種時間與地點。此方式是應用健康信念模式的那些要素？①增加行動線索 ②降低行動障礙認知 ③增進疾病嚴重度的認知 ④提升自我效能 ①①② ②①④ ③②③ ④②④。
377	社區護理師於社區關懷據點推動健康飲食計畫，記錄每次活動參與人數，是屬於下列何者護理指導的評價？ ①過程評價 ②效益評價 ③成果評價 ④發展評價。
378	有關健康促進介入措施描述，下列何者最不適當？ ①提供健康知識教育民眾做正確決定 ②透過正向或負向增強法促使民眾行為改變 ③透過法律制定酒駕罰則增進社區賦權 ④透過社區賦權使民眾獲得更多控制權。
379	為社區民眾進行護理指導時，下列策略何者無法促進情意層面的改變？ ①認同運動有益健康 ②說出對運動的喜愛 ③願意安排可以運動的時間 ④列舉三項有益健康的運動。
380	下列何者最適合用來解釋嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）的致病模式？ ①三角模式 ②輪狀模式 ③生態模式 ④網狀模式。
381	有關自來水廠水質處理工程中曝氣法（aeration）的目的，下列何者最適當？①增加水中溶氧量 ②去除不良氣味 ③降低 pH 值 ④淨化水質 ①①② ②②③ ③②④ ④③④。
382	有關傳染病與其病媒的敘述，下列何者錯誤？ ①霍亂—蒼蠅 ②鼠疫—跳蚤 ③萊姆病—蚊子 ④漢他病毒症候群—老鼠。
383	有關 Smilkstein 所提出之 APGAR 家庭功能評估的敘述，下列何者錯誤？ ①融洽度（resolve）是指家庭成員對於彼此共享各種資源的滿意情形 ②情感度（affection）是指家庭成員對於彼此之間互相關愛的情形 ③成長度（growth）是指家庭成員對於彼此之間相處所衍生壓力的調適情形 ④適應度（adaptation）是指家庭在發生問題或面臨困難的時候，家庭成員對於內在資源或外在資源的運用情形。
384	王女士，45 歲，山地原住民女性，平時沒有抽菸、飲酒習慣，從沒參加社區健康篩檢活動，今天第一次參加篩檢。下列何者為其可使用的公費篩檢項目？①成人預防保健服務 ②子宮頸癌篩檢 ③大腸癌篩檢 ④B、C 型肝炎篩檢 ⑤乳癌篩檢 ⑥口腔癌篩檢 ①①②④⑤ ②①②⑤⑥ ③①③⑤⑥ ④②③④⑥。
385	林先生與父親、太太和二位幼稚園女兒同住。請問林家是屬於何種家庭類型？ ①公社家庭（commute family） ②大家庭（extended family） ③折衷家庭（stem family） ④核心家庭（nuclear family）。
386	社區護理師用來改善社區獨居老人支持系統的措施，下列何者最不適當？ ①介紹參與宗教活動 ②定期關懷訪視 ③轉介社福機構 ④建議入住長期照護機構。

387	有關護理師對更年期婦女的護理指導，下列何者最不適當？ ①結合社區活動促進婦女彼此分享經驗 ②提供相關保健資訊與協助 ③鼓勵使用賀爾蒙替代療法減輕不適症狀 ④鼓勵以正向態度面對。
388	下列何項資料最適合用來收集社區民眾的價值觀、行為特質、風俗習慣、文化特性以及政治體系？ ①社區的地理疆界 ②社區發展史 ③人口學組成 ④自然資源。
389	有關校園結核病護理指導，下列何者正確？①結核病主要為直接接觸傳染應保持教室通風 ②教職員 生若有咳嗽超過一週應建議其盡速就醫 ③都治計畫是針對確診個案的治療策略 ④結核病指標個案是指確定診斷的結核病病人 ①①② ②②③ ③③④ ④①④。
390	有關醫療工作環境常見的危害因子，下列何者最不適當？ ①X射線 ②熱傷害 ③微生物 ④針扎。
391	有關學校護理師應用流行病學方法進行校園評估的目的，下列何者最不適當？ ①用於疾病監測 ②瞭解校園環境中危險因子 ③用於教學器材設備管理 ④提供衛生教育宣導。
392	有關居家式照顧服務的敘述，下列何者較不適當？ ①護理人員可獨立開設居家護理所 ②居家護理可提供鼻胃管、氣切、尿管之照護 ③依照顧管理中心專員評估需求，必要者可提供居家復健服務 ④居家藥事服務不屬於服務範圍。
393	陳先生 75 歲，因腦中風住院，出院時留置鼻胃管及導尿管，並申請全民健康保險居家護理服務。居家護理師對照顧者的指導，下列敘述何者最不適當？ ①居家護理師可每月 2 次至家中進行鼻胃管及尿管更換 ②照顧者需要學習鼻胃管灌食及尿管照護技巧，並每日進行管路清潔與消毒 ③醫師可每月 1 次至家中診療個案 ④照顧者如發現陳先生有管路滑脫可致電居家護理所處理。
394	林先生工作中從鷹架跌落，脊椎受傷導致四肢癱瘓，已經從醫院出院返家，其主要照顧者為妻子，且 家中浴室狹小，社區護理師發現其妻每天協助擦澡，主訴每天照顧先生感到很疲憊。提供下列長照資源何者較適當？①轉介住日間照顧 ②進行復健訓練 ③轉介使用喘息服務 ④轉介住安養中心 ⑤轉介使用居家無障礙改善服務 ①①②⑤ ②②③④ ③②③⑤ ④③④⑤。
395	承上題，林太太所需的支持性服務，下列何者最不適當？ ①教導脊髓損傷照護技巧 ②轉介林先生至社區照顧關懷據點 ③加入家庭照顧者支持團體 ④教導壓力處理技巧。
396	有關長者在家進行肌力和肌耐力訓練，下列敘述何者錯誤？ ①長者每週應累計至少 150 分鐘中等費力運動 ②運動的強度，以不疼痛為原則，體能提升後再逐漸增加活動的類型、強度及次數 ③坐姿肌力訓練不適合長者採用 ④除特殊禁忌外，身體活動量不足且體能差的長者，以增加日常性活動為優先。

397	67 歲的歐陽先生於上個月參加成人健檢，檢查結果：三酸甘油脂為 218 mg/dL，低密度膽固醇 196 mg/dL，血壓 158/110 mmHg，空腹血糖 99 mg/dL。下列何者不是心血管疾病危險因子？ ①高血壓 ②大於 60 歲 ③高血脂 ④高血糖。
398	有關老人跌倒的危險因子中，下列何者屬於外因性的因素？ ①光線不足 ②中風病史 ③使用鎮靜劑 ④白內障。
399	有關慢性腎臟病初期病人的飲食指導，下列何者最不適當？ ①建議攝取高品質蛋白質食物為原則 ②麵筋、麵腸等屬高蛋白質食物可以多食用 ③減少攝取磷含量高的食物 ④多食蔬菜且儘量減少湯汁攝取。
400	有關中老年慢性病個案管理的目標，下列何者最不適當？ ①個案學習自我照顧是最終目標 ②定期監測疾病，以利早日痊癒 ③控制疾病，預防合併症產生 ④個案能利用資源，接受疾病相關的保健諮詢。